

EMBRİYO TRANSFERİNDEN SONRA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Yatak istirahatını takiben hastaneden ayrılabilirsiniz. Evde 2 gün kadar istirahat ediniz. Daha uzun süreli yatak istirahatının gebelik şansını artırdığı kanıtlanmamıştır.
2. Gebelik testi sonucunu alıncaya kadar spor, ağır iş, temizlik, bulaşık ağır yük kaldırma ve çok aktif çalışma gibi aktivitelerden kaçınınız.
3. Günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
4. Duş alabilirsiniz.
5. 2 gün istirahattan sonra çalışıyorsanız işinize dönebilirsiniz.
6. Uçak araba ve otobüs gibi ulaşım araçlarına binebilirsiniz.
7. 1-2 gün adet ağrısına benzer bel ve kasık ağrısı az miktarda vajinal kanama olabilir endişelenmenize gerek yoktur.
8. Gebelik testi yapıncaya kadar cinsel ilişkide bulunmayınız.
9. Nefes almada zorluk, karında aşırı şişkinlik, idrar yapımında azalma, bulantı kusma gibi yakınmalarınız olursa merkezimize haber veriniz.
10. Bu dönem içinde herhangi bir radyolojik tetkik gerekirse doktorunuza haber veriniz.
11./...../20.... tarihinde kanda beta-hCG (kanda gebelik) testi yaptırınız. İstanbul da iseniz test için merkezimize geliniz. İstanbul dışında iseniz yaptırdığınız test sonucunu merkezimize fakslayınız.
12. Vajinal kanamanız olsa bile test günü geldiğinde gebelik testini yaptırınız. Bu kanama adet kanaması olabileceği gibi dış gebelik veya kötü giden bir gebelik olabilir.
13. Testiniz pozitif ise iki gün sonra tekrar ikinci gebelik testini yaptırarak sonucu bize bildiriniz.

Kullanmanız gereken ilaçlar şunlardır:

1) Daha önceden başlayan ilaçlarınız(Alfoxil, Prednol) süreleri tamamlanınca bırakın.

2) Progestan 50 mgr amp 1 amp olarak kalçadan gebelik testi gününe kadar devam ediniz.

3).....

4).....

5).....

Tedavinizin Başarı ile Sonuçlanması Dileğiyle...

GOP Tüp Bebek Ekibi

Her Türlü Sorularınız için Tel : (212) 615 38 38 /3314 – 3518

Fax: (212) 453 90 46